

医薬品を正しく購入するための  
説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	エージーアレルカット(is/ic/im)
2	成分・分量	100mL 中 クロモグリク酸ナトリウム 1g、クロルフェニラミンマレイン酸塩 0.015g、 グリチルリチン酸二カリウム 0.125g、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム 0.2g ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	1回 1～2滴、1日 4～6回点眼して下さい。  <用法・用量に関連する注意> 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。 また、混濁したものは使用しないで下さい。 コンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。 (※imのみ)本剤はとろみのある薬液のため、点眼後、しばらく視野がぼやけることが ありますので注意して下さい。
4	効能・効果	花粉、ハウスダスト(室内塵)等による次のような目のアレルギー症状の緩和： 目のかゆみ、目の充血、目のかすみ(目やにの多いとき等)、なみだ目、 異物感(コロコロする感じ)
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	1. 次の人は使用しないで下さい。 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。  次に該当する人はお申し出下さい。 (1)医師の治療を受けている人 (2)減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人 (4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5)次の症状のある人：はげしい目の痛み (6)次の診断を受けた人：緑内障 (7)アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人 特に次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師に 相談して下さい。 ●片方の目だけに症状がある場合 ●目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合 ●視力にも影響がある場合
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。