


- エージーアレルカット i s ● エージーアレルカット i m
- エージーアレルカット i c
- エージーアイズアレルカット S ● エージーアイズアレルカット M
- エージーアイズアレルカット C

【使用上の注意】

【解 説】

 使用上の注意

 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 点鼻薬と併用する場合には、使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気等があらわれることがあります)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人
はげしい目の痛み
 - (6) 次の診断を受けた人
緑内障

1. 共通事項解説〔1〕参照
クロモグリク酸ナトリウムにより起こることがあります。
2. 点鼻薬と併用すると、クロルフェニラミンマレイン酸塩をはじめとする抗ヒスタミン剤の使用量が増え、眠気等を生じる可能性があるため、重大な事故につながるおそれがあります。

1.
 - (1) 共通事項解説〔4〕参照
 - (2) 医師の投薬又は治療を受けている場合には、本剤の成分との重複使用により副作用を起こしたり、医師による治療を妨げるおそれがあります。
 - (3) 共通事項解説〔5〕参照
 - (4) 共通事項解説〔7〕参照
 - (5) 記載されている症状のある人は、下記のような理由で使用前に相談が必要です。
 - はげしい目の痛み
激しい目の痛みは、急性緑内障、角膜潰瘍あるいは外傷等が原因の場合が考えられ、これらはいずれも専門医の処置を受ける必要があります。
 - (6) 記載されている疾患の診断を受けた人は、本剤に配合されている成分により、病状が悪化するおそれがありますので、使用前に相談が必要です。
 - 緑内障
抗ヒスタミン剤(クロルフェニラミンマレイン酸塩)の抗コリン作用により、房水水路が狭くなり、眼圧が上昇し、緑内障を悪化させるおそれがあります。

- エージーアレルカット i s ● エージーアレルカット i m
- エージーアレルカット i c
- エージーアイズアレルカット S ● エージーアイズアレルカット M
- エージーアイズアレルカット C

【使用上の注意】

(7) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはつきりしない人
特に次のような場合はアレルギーによるものとは断定できないため、使用前に医師に相談して下さい。

- 片方の目だけに症状がある場合
- 目の症状のみで、鼻には症状がみられない場合
- 視力にも影響がある場合

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、痛み

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(1) 目のかすみ改善されない場合

(2) 2日間位使用しても症状がよくなる場合

4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【用法・用量に関連する注意】

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
3. 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないで下さい。また、混濁したものは使用しないで下さい。

【解 説】

(7) 花粉やハウスダスト等による目のアレルギー症状に効果を発揮する点眼薬ですので、アレルギーが原因であることを確認する必要があります。
アレルギー以外の原因の場合に、使用を避けるための目安を記載しています。

2. 例示したような副作用症状が起こる可能性があります。これらの症状があらわれた場合には、症状の増悪や重篤な副作用への移行を未然に防ぐため、直ちに使用を中止し、使用している薬剤の成分等がわかる添付文書を持参の上、専門家に相談する必要があります。

下記のような重篤な症状があらわれたら、直ちに使用を中止し、医師の診療を受ける必要があります。

- ショック(アナフィラキシー)
重篤な症状の解説[1]参照
医療用クロモグリク酸ナトリウム2%点眼液の使用により、まれではありますが、アナフィラキシー(呼吸困難、血管浮腫、じんましん等)の報告があります。例示したような症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止して医師の診療を受ける必要があります。

3.

(1) 緑内障、白内障、糖尿病性網膜症等の疾患の可能性があり、これらの場合は早期に専門医の診療を受ける必要があります。

(2) 2日間位使用しても症状の改善がみられない場合は、他の疾患や合併症も考えられるので、使用を中止し、専門家に相談する必要があります。

4. 本剤に限らず、一般用医薬品は症状の経過をみながら使用することが大切です。本剤の場合は、安全性、有効性の両面から、2週間を目処として経過を専門家に相談するよう求めています。

1. 共通事項解説[8]参照

2. 共通事項解説[9]参照

3. 容器の先がまぶたやまつ毛に触れると、目やにや雑菌が容器内に入り、微生物等による汚染、混濁等を起こす危険があります。

- エージアレルカット i s ● エージアレルカット i m
- エージアレルカット i c
- エージアイズアレルカット S ● エージアイズアレルカット M
- エージアイズアレルカット C

【使用上の注意】

4. コンタクトレンズを装着したまま使用しないで下さい。
5. 点眼用にのみ使用して下さい。
6. 本剤はとろみのある薬液のため、点眼後、しばらく視野がぼやけることがありますのでご注意ください。
▶ エージアレルカット i m
▶ エージアイズアレルカット M

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。
また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。容器の使用期限表示(裏面上段)は、西暦、月を表示しています。
- (6) 自動車の中や暖房器具の近く等、高温(40℃以上)の所に置かないで下さい。
(容器が変形することがあります)

【解 説】

4. 点眼液によりコンタクトレンズが変形したり着色したりする場合があります。また、二次的に角膜が障害されるおそれがあります。
 5. 定められた投与経路、適用部位以外への使用は、思わぬ副作用や事故が発生するおそれがあります。
 6. 本剤はとろみの高い薬液のため、点眼後に視野がぼやけると感じることがあります。このような症状は一過性のものであり、角膜上に薬液がいきわたればもとにもどります。心配はいりませんが、点眼直後は怪我等をしないように注意する必要があります。
1. 共通事項解説〔11〕参照
 2. 共通事項解説〔12〕参照
 3. 共通事項解説〔13〕参照
 4. 汚染による感染を防ぐための注意です。
 5. 共通事項解説〔17〕参照
 6. 40℃以上の高温の場所に置いておくと容器が変形したり、品質に影響を及ぼすおそれがあります。