

- エージーアレルカットS ● エージーアレルカットM
- エージーアレルカットC
- エージーノーズアレルカットS ● エージーノーズアレルカットM
- エージーノーズアレルカットC

【使用上の注意】

【解 説】



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい。
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。
(眠気等があらわれることがあります)
3. 長期連用しないで下さい。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
- (6) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人

1. 共通事項解説〔1〕参照
クロモグリク酸ナトリウムにより起こることがあります。
2. 抗ヒスタミン剤(クロルフェニラミンマレイン酸塩)は、眠気等を生じる可能性があるため、重大な事故につながるおそれがあります。
3. ナファゾリン塩酸塩は長期間(2週間程度)や過度に使用(使用法を超える回数)すると、かえって二次的な充血、鼻づまりを起こす場合があります。また、本剤を長期連用することにより、薬剤の効き目が悪くなったり、薬効が切れたときのリバウンドが起こるおそれもあります。
1.
 - (1) 共通事項解説〔4〕参照
 - (2) 医師の投薬又は治療を受けている場合には、本剤の成分との重複使用による副作用を起こしたり、医師による治療を妨げるおそれがあります。
 - (3) 共通事項解説〔5〕参照
 - (4) 共通事項解説〔7〕参照
 - (5) 記載されている疾患の診断を受けた人は、本剤に配合されている成分により、病状が悪化するおそれがありますので、使用前に相談が必要です。
 - 高血圧、心臓病、甲状腺機能障害
ナファゾリン塩酸塩の交感神経刺激作用(血管収縮作用)により、血圧を上昇させ、心拍数を増加させるため、高血圧、心臓病、甲状腺機能亢進症(動悸、発汗、手のふるえ、いらいら等)の症状を悪化させるおそれがあります。
 - 糖尿病
ナファゾリン塩酸塩の交感神経刺激作用により、肝臓のグリコーゲンが分解され血糖値が上昇し、悪化するおそれがあります。
 - 緑内障
抗ヒスタミン剤(クロルフェニラミンマレイン酸塩)の抗コリン作用により、房水流水路が狭くなり、眼圧が上昇し、緑内障を悪化させるおそれがあります。
 - (6) 花粉やハウスダスト等による鼻のアレルギー症状に効果を発揮する点鼻薬ですので、アレルギーが原因であることを確認する必要があります。

- エージーアレルカットS ● エージーアレルカットM
- エージーアレルカットC
- エージーノーズアレルカットS ● エージーノーズアレルカットM
- エージーノーズアレルカットC

【使用上の注意】

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
鼻	はれ、刺激感、鼻出血
精神神経系	頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【用法・用量に関連する注意】

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
3. 7歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
4. 点鼻用にのみ使用して下さい。

【成分・分量に関連する注意】

本剤はアルコールを含んでいますので、しみることがあります。

- ▶ エージーノーズアレルカットM
- ▶ エージーノーズアレルカットC

【解 説】

2. 例示したような副作用症状が起こる可能性があります。これらの症状があらわれた場合には、症状の増悪や重篤な副作用への移行を未然に防ぐため、直ちに使用を中止し、使用している薬剤の成分等がわかる添付文書を持参の上、専門家に相談する必要があります。

下記のような重篤な症状があらわれたら、直ちに使用を中止し、医師の診療を受ける必要があります。

● ショック(アナフィラキシー)

重篤な症状の解説〔1〕参照

医療用クロモグリク酸ナトリウム2%点鼻液の使用により、まれではありますが、アナフィラキシー（呼吸困難、血管浮腫、じんましん等）の報告があります。例示したような症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止して医師の診療を受ける必要があります。

3. 3日間位使用しても症状の改善がみられない場合は、他の疾患や合併症も考えられるので、使用を中止し、専門家に相談する必要があります。
4. 本剤に限らず、一般用医薬品は症状の経過をみながら使用することが大切です。本剤の場合は、安全性、有効性の両面から、2週間を目処として経過を専門家に相談するように求めています。

1. 共通事項解説〔8〕参照
2. ナファゾリン塩酸塩は、過度に使用するとかえって二次的な充血、鼻閉を起こすことがあります。
3. 共通事項解説〔9〕参照
4. 定められた投与経路、適用部位以外への使用は、思わぬ副作用や事故が発生するおそれがあります。

アルコールにより、感じる場合があります。

- エージーアレルカットS ● エージーアレルカットM
- エージーアレルカットC
- エージーノーズアレルカットS ● エージーノーズアレルカットM
- エージーノーズアレルカットC

【使用上の注意】

【解 説】

【保管及び取扱い上の注意】

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管して下さい。 2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。 3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります) 4. 他の人と共用しないで下さい。 5. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は速やかに使用して下さい。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 共通事項解説〔11〕参照 2. 共通事項解説〔12〕参照 3. 共通事項解説〔13〕参照 4. 汚染による感染を防ぐための注意です。 5. 共通事項解説〔17〕参照 |
|--|---|