

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	第一三共胃腸薬グリーン錠
2	成分・分量	<p>9錠中 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 360mg、合成ヒドロタルサイト 480mg、 炭酸水素ナトリウム 480mg、ロートエキス 3倍散 90mg、ウイキョウ末 30mg、 ケイヒ末 180mg、チヨウジ末 30mg、ゲンチアナ末 90mg、センブリ末 5mg、 ビオチン 2000 60mg、リパーゼ AP6 60mg、銅クロロフィリンナトリウム 48mg、 カンゾウ末 150mg</p> <p><成分・分量に関連する注意> 本剤に配合されている銅クロロフィリンナトリウムにより、便が緑色になることがあります。 ※添加物は外箱、添付文書を参照</p>
3	用法・用量	<p>下記の1回量を1日3回、食後に服用して下さい。</p> <p>成人(15歳以上):3錠 11歳以上15歳未満:2錠 11歳未満:服用しないで下さい。</p>
4	効能・効果	<p>●飲み過ぎ(過飲)、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、 悪心)、嘔吐</p> <p>●胃酸過多、胃痛、胸やけ、胃重、胃部不快感、げっぷ(おくび)</p> <p>●胸つかえ、もたれ(胃もたれ)、食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、胃弱</p> <p>●食べ過ぎ(過食)、消化不良、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感</p>
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないで下さい。 透析療法を受けている人</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。 胃腸鎮痛鎮痙薬</p> <p>3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。 (母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)</p> <p>4. 長期連用しないで下さい。</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい。</p> <p>(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人 排尿困難</p> <p>(6) 次の診断を受けた人 腎臓病、心臓病、緑内障</p> <p><その他の注意> 母乳が出にくくなる場合があります。</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。