

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新フジサワ胃腸薬クール
2	成分・分量	<p>3 包(1 包 1.5g) 中 シュクシャ末 60mg、チヨウジ末 105mg、ケイヒ末 240mg、カンゾウ末 300mg、 ビオジアスターゼ 300mg、リパーゼ 60mg、炭酸水素ナトリウム 1650mg、 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 1200mg</p> <p><成分・分量に関連する注意> 本剤に配合されている銅クロロフィリンナトリウムにより、便が緑色になることがあります。 ※添加物は外箱、添付文書を参照</p>
3	用法・用量	<p>次の1 回量を1 日3 回、毎食後に服用して下さい。</p> <p>15 歳以上:1 包 11 歳以上 15 歳未満:2/3 包 8 歳以上 11 歳未満:1/2 包 5 歳以上 8 歳未満:1/3 包 3 歳以上 5 歳未満:1/4 包 3 歳未満:服用しないで下さい。</p>
4	効能・効果	<p>もたれ(胃もたれ)、食べすぎ(過食)、飲みすぎ(過飲)、胸やけ、胃部・腹部膨満感、 消化不良、消化促進、食欲不振(食欲減退)、胃弱、胃酸過多、胸つかえ、胃部不快感、 胃重、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、 悪心)、嘔吐、胃痛、胃部膨満感、消化不良による胃部・腹部膨満感</p>
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないで下さい。 透析療法を受けている人 2. 長期連用しないで下さい。</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい。 (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の診断を受けた人 腎臓病</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

[注意事項]

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。