

ロキソニンSシリーズ(テープ・テープL・パップ・ゲル・ローションa・ハードゲル・温感テープ・温感テープL)

ロキソニンEXシリーズ(テープ・テープL・ゲル・ローション)

年 月 日

このお薬は？

ロキソニンSシリーズ

販売名	ロキソニンSテープ・ロキソニンSテープL	ロキソニンSパップ	ロキソニンSゲル・ロキソニンSローションa ・ロキソニンSハードゲル
成分・分量	膏体100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 5.67g (無水物として 5g)	膏体100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.134g (無水物として 1g)	100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.13g (無水物として 1g)

販売名	ロキソニンS温感テープ・ロキソニンS温感テープL
成分・分量	膏体100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 5.67g (無水物として 5g) ノナン酸バニリルアミド 0.015g

ロキソニンEXシリーズ

販売名	ロキソニンEXテープ・ロキソニンEXテープL	ロキソニンEXゲル	ロキソニンEXローション
成分・分量	膏体100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 8.10g (無水物として 7.14g) L-メントール 3.5g トコフェロール酢酸エステル 2.3g	100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.13g (無水物として 1g) L-メントール 3.0g	100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.13g (無水物として 1g) L-メントール 3.0g

このお薬は、有効成分として、非ステロイド性消炎・鎮痛剤(NSAIDs)と呼ばれるグループに属するロキソプロフェンナトリウム水和物を含有する外用薬です。ロキソプロフェンナトリウム水和物は、痛み・炎症の原因物質「プロスタグランジン」の生成を抑え、痛みやはれをやわらげます。

このお薬の効果は？

このお薬は、腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫に効果を発揮します。

このお薬を使用する前に、確認すべきことは？

次の人はこのお薬を使用することはできません

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人(再びアレルギー症状があらわれるおそれがあります)
 - 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬※を使用してぜんそくを起こしたことがある人(非ステロイド性消炎鎮痛成分により、再びぜんそく発作を起こすおそれがあります)
- 【※代表的な成分：アスピリン(アセチルサリチル酸)、アスピリンアルミニウム、アセトアミノフェン、インプロピルアンチピリン、イブプロフェン、インドメタシン、エテンザミド、ジクロフェナクナトリウム、フェルピナク及びロキソプロフェンナトリウム水和物】
- 15歳未満の小児

次の部位には使用しないで下さい

- 目の周囲、粘膜等(強い刺激や痛みがあらわれるおそれがあります)
- 皮膚の弱い部位(顔、わきの下等)
※Sゲル・Sローションa・Sハードゲル/EXゲル・EXローションのみ(強い刺激や痛みがあらわれるおそれがあります)
- しっしん、かぶれ、傷口(傷ついた皮膚は刺激が生じやすく、しっしんに使用すると症状が悪化するおそれがあります)
- みずむし・たむし等又は化膿している患部(症状が悪化するおそれがあります)

次の人はこのお薬を使用する際に注意が必要です。

使用する前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談下さい。

- 医師の治療を受けている人(医師から処方された薬との重複等により治療に影響を及ぼすおそれがあります)
- 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人(類縁の薬の使用を避ける必要があります)
- 妊婦又は妊娠していると思われる人(胎児に悪影響を与えるおそれがあり、薬の使用には慎重を期す必要があります)
- 高齢者(一般に高齢者は皮膚が弱くなっている傾向があり、また、高齢者で皮膚症状の副作用発現率が高かったとの報告があります。高齢者は使用する部位の皮膚状態に注意が必要です)
- 次の診断を受けた人
気管支ぜんそく(病態を悪化させるおそれがあります)

このお薬は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するものではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、**症状がある場合だけ使用して下さい。**

このお薬の使い方は？

[ロキソニンSテープ・テープL・温感テープ・テープL/ロキソニンEXテープ・テープL]

(用法・用量)

表面のライナー(フィルム)をはがし、**1日1回**患部に貼付して下さい。

(使い方)

- ・1回あたり全身で、**テープは4枚、テープLは2枚を超えて使用しないで下さい。**
- ・汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。
- ・貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないで下さい。
※S温感テープ・S温感テープLのみ。
- ・皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。

- ① フィルム側を手前にして軽く折り曲げ、フィルムの真ん中の部分を最初にはがします。
- ② フィルムをはがした真ん中の接着部分を患部に当てて、テープの位置を固定します。
- ③ フィルムの山をつまんで、片方ずつフィルムをゆっくりはがします。左右のフィルムをどちらからはがしてもかまいません。




[ロキソニンSパップ]

(用法・用量)

表面のライナー(フィルム)をはがし、**1日1回**患部に貼付して下さい。

(使い方)

- ・1日あたり全身で、**2枚を超えて使用しないで下さい。**
- ・汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用して下さい。
- ・皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用して下さい。



【ロキソニンSゲル/ロキソニンEXゲル】

(用法・用量)


1日3～4回、適量を患部に塗擦して下さい。

(使い方)

- ・使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないで下さい。(かぶれたり、薬剤の浸透性が増加して、刺激等が強くなります)
- ・**1回あたり全身で8cm(約2g)、1週間あたり50gを超えて使用しないで下さい。**
- ・目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- ・本剤はエタノールを含有していますので、アルコール過敏症の方は使用しないで下さい。
- ・外用にのみ使用して下さい。
- ・使用後は、手を洗って下さい。

①1回の使用量をチューブから出します。


②患部に薄く塗り広げます。



※1回使用量の目安

肩・ひじ・ひざ：約2～3cm(4回の使用で約3g)

腰：約3～5cm(4回の使用で約6g)



【ロキソニンSローションa/ロキソニンEXローション】

(用法・用量) **1日3～4回**、適量を患部に塗布して下さい。


(使い方)

- ・使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないで下さい。(かぶれたり、薬剤の浸透性が増加して、刺激等が強くなります)
- ・**1回あたり全身で約2g(塗布面積：手のひら約10枚分)、1週間あたり50gを超えて使用しないで下さい。**
- ・目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- ・本剤はエタノールを含有していますので、アルコール過敏症の方は使用しないで下さい。
- ・外用にのみ使用して下さい。

《容器の使い方》

スポンジ面を下にしてゆっくり患部に数回押しあて、スポンジに薬液を十分浸透させてから使用して下さい。

1. 薬液がスポンジに十分浸透していないと、スポンジが破れることがありますので注意して下さい。
2. 使用後はスポンジの乾燥を防ぐため、必ずキャップをしっかりと閉めて下さい。



【ロキソニンSハードゲル】


(用法・用量) **1日3～4回**、適量を患部に塗擦して下さい。

(使い方)

- ・使用部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないで下さい。
- ・**1回あたり約2g(塗擦面積：手のひら約10枚分)、1週間あたり50gを超えて使用しないで下さい。**
- ・目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。
- ・外用にのみ使用して下さい。
- ・汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭きとってから使用して下さい。
- ・容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を3～4mm出してから使用して下さい。
- ・薬剤底部の受け皿が見え、ガタつくようになったら、本剤の使用をやめて下さい。また、受け皿に残った薬剤は無理に使用しないで下さい。

《容器の使い方》

1. 上部のキャップをはずして下さい
2. 下部のダイヤルを右へ回し、薬剤を3～4mm出して下さい。
3. 適量を患部に押し当てながら塗して下さい。
4. 使用後はダイヤルを最後まで左へ回して薬剤を戻し、必ずキャップを閉めて保管して下さい。



このお薬の使用中に気をつけなければならないことは？

- 使用后、以下の症状があらわれることがあります。このような場合は、副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、製品の外箱(ゲル・ローション・ローションa・ハードゲルは添付文書)を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、痛み*1、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱、青あざができる*2、色素沈着
消化器	胃部不快感、みぞおちの痛み
その他	むくみ

※1:温感テープ、温感テープのみ

※2:テープ、テープL、パップのみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 使用后、次の症状があらわれることがあります。このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、製品の外箱(ゲル・ローション・ローションa・ハードゲルは添付文書)を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

下痢・軟便

- **連続して2週間以上使用しないで下さい。**

本剤は痛みを一時的におさえるものです。痛み等の症状が継続する場合には、使用を中止し、製品の外箱(ゲル・ローション・ローションa・ハードゲルは添付文書)を持って、医師の診療を受けて下さい。

※高齢者では、骨の強度低下により、軽い外力でも骨折してしまうケース(脆弱性骨折)が多く見られます。痛み等の症状が継続する場合には、整形外科専門医の診療を受けて下さい。

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は、他の疾患の可能性*も考えられますので、使用を中止し、製品の外箱(ゲル・ローション・ローションa・ハードゲルは添付文書)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

※新たに皮疹(帯状疱疹など)があらわれた場合には、皮膚科専門医の診療を受けて下さい。

- 本剤を使用している間は、同様の効果を持つ、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないで下さい。(併用により、副作用が強くなるおそれがあります)

このお薬の形は？

販売名	ロキソニンSテープ ロキソニンS温感テープ ロキソニンEXテープ	ロキソニンSテープL ロキソニンS温感テープL ロキソニンEXテープL	ロキソニンSパップ
剤形等	テープ剤	テープ剤	パップ剤
サイズ	7cm×10cm	10cm×14cm	10cm×14cm

販売名	ロキソニンSゲル ロキソニンEXゲル	ロキソニンSローションa ロキソニンEXローション	ロキソニンSハードゲル
剤形等	ゲル剤	ローション剤	固形状ゲル剤
サイズ	—	—	—

このお薬に含まれているものは？

販売名	ロキソニンSテープ・ロキソニンSテープL
有効成分	膏体100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 5.67g (無水物として 5g)
添加物	ステレン・イソブレン・ステレンブロックコポリマー、ポリイソブチレン、水添ロジングリセリンエステル、BHT、l-メントール、流動パラフィン、その他2成分

販売名	ロキソニンSパップ
有効成分	膏体100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.134g (無水物として 1g)
添加物	ハッカ油、ポリソルベート80、酸化チタン、酒石酸、エト酸Na、グリセリン、カルメロースNa、タルク、水酸化Al、クロナミン、ポリアクリル酸部分中和物、その他2成分

販売名	ロキソニンSゲル
有効成分	100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.13g (無水物として 1g)
添加物	エタノール、1,3-ブチレングリコール、ヒプロメロース、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン

販売名	ロキソニンSローションa
有効成分	100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.13g (無水物として 1g)
添加物	1,3-ブチレングリコール、ヒプロメロース、リン酸、リン酸水素Na、エタノール
成分・分量に関連する注意	本剤はアルコールを含んでいますので、しみることがあります。

販売名	ロキソニンSハードゲル
有効成分	100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.13g (無水物として 1g)
添加物	ステアリン酸Na、ステアリン酸マクロゴール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、水酸化Na、エタノール

販売名	ロキソニンS温感テープ・ロキソニンS温感テープL
有効成分	膏体100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 5.67g (無水物として 5g) ノナン酸バニリルアミド 0.015g
添加物	スチレン・イソプレン・スチレンブロックコポリマー、ポリイソブチレン、水添ロジングリセリンエステル、BHT、l-メントール、流動パラフィン、その他2成分

販売名	ロキソニンEXテープ・ロキソニンEXテープL
有効成分	膏体100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 8.10g (無水物として 7.14g) トコフェロール酢酸エステル 2.3g l-メントール 3.5g
添加物	スチレン・イソプレン・スチレンブロックコポリマー、ポリイソブチレン、水添ロジングリセリンエステル、BHT、ステアリン酸亜鉛、流動パラフィン、その他3成分

販売名	ロキソニンEXゲル
有効成分	100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.13g (無水物として 1g) l-メントール 3g
添加物	エタノール、マクロゴール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、トリエタノールアミン

販売名	ロキソニンEXローション
有効成分	100g中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.13g (無水物として 1g) l-メントール 3g
添加物	1,3-ブチレングリコール、ヒプロメロース、リン酸、リン酸水素Na、エタノール
成分・分量に関連する注意	本剤はアルコールを含んでいますので、しみることがあります。

その他

○ このお薬の保管方法は？

**【ロキソニンSテープ・テープL・パップ・温感テープ・温感テープL/
ロキソニンEXテープ・テープL】**

- ・直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- ・小児の手の届かない所に保管して下さい。
- ・他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- ・品質保持のため、開封後の未使用分は袋に入れ、袋のチャックをきちんと閉めて保管して下さい。
- ・表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、アルミ袋を開封した後は、なるべく早く使用して下さい。

【ロキソニンSゲル・ローションa/ロキソニンEXゲル・ローション】

- ・直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- ・小児の手の届かない所に保管して下さい。
- ・他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- ・火気に近づけないで下さい。(本剤はエタノールを含有しています)
- ・本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。
- ・表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、開封した後は、なるべく早く使用して下さい。

【ロキソニンSハードゲル】

- ・直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- ・揮発性がありますので、使用後はキャップをきちんと閉めて、外気にふれないようにして下さい。
- ・小児の手の届かない所に保管して下さい。
- ・他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- ・火気に近づけないで下さい。
- ・本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。
- ・表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は速やかに使用して下さい。

このお薬についてのお問い合わせ先は？

- 症状、使用方法、副作用などのより詳しい質問がある場合は、医師、薬剤師又は登録販売者にお問い合わせ下さい。
- 一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせ下さい。

第一三共ヘルスケア株式会社

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話：0120-337-336

受付時間：9:00~17:00(土、日、祝日、当社休日を除く)

2024年2月作成