

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	新ルル点鼻薬
2	成分・分量	1mL 中： ナファゾリン塩酸塩 0.5mg、クロルフェニラミンマレイン酸塩 5mg、塩酸リドカイン（無水物として）3mg、ベンゼトニウム塩化物 0.2mg
3	用法・用量	成人(15歳以上)：1回1～2度ずつ、3～4時間ごとに1日6回まで、両鼻腔内に噴霧してください。 15歳未満：使用しないでください。
4	効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、頭重
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 長期連用しないで下さい 次に該当する人はお申し出下さい (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人 (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。