

- オイラックスソフト
- マキロンかゆみどめ液P

### 【使用上の注意】

#### 使用上の注意

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。

- (1) 目の周囲、粘膜等  
▶ マキロンかゆみどめ液P
- (2) 傷口のある患部  
▶ マキロンかゆみどめ液P



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 湿潤やただれのひどい人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ*、乾燥感*、刺激感*、熱感*、ヒリヒリ感*

※オイラックスソフト

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### 【使用法に関連する注意】

1. 使用法を厳守して下さい。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。
3. 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗って下さい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けて下さい。

### 【解 説】

- (1) 目の周囲や粘膜等は感受性が強く、本剤を使用することにより刺激感が強くあらわれたり、症状が悪化するおそれがあります。
- (2) このような患部に本剤を使用すると、刺激感が強くあらわれたり、症状が悪化するおそれがあります。

1.
  - (1) 共通事項解説〔4〕参照
  - (2) 共通事項解説〔7〕参照
  - (3) 湿潤やただれのひどい人が本剤を塗布すると、刺激感が強くあらわれたり、症状が悪化するおそれがあります。

2. 例示したような副作用症状が起こる可能性があります。これらの症状があらわれた場合には、症状の増悪や重篤な副作用への移行を未然に防ぐため、直ちに使用を中止し、使用している薬剤の成分等がわかる添付文書を持参の上、専門家に相談する必要があります。

3. 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合は、他の疾患や合併症も考えられるので、使用を中止し、専門家に相談する必要があります。

1. 共通事項解説〔8〕参照
2. 共通事項解説〔9〕参照
3. 本剤が万一、目に入った場合、強い刺激を感じると共に、充血を起こし腫張をきたす等が考えられます。このような場合は直ちに目を水で洗い流し、薬を取り除いて下さい。また、水洗いしても刺激がいつまでも続いたり、涙が止まらない場合には、眼科医の診療を受けて下さい。

- オイラックスソフト
- マキロンかゆみどめ液P

### 【使用上の注意】

4. 粘膜には使用しないで下さい。  
▶ オイラックスソフト
5. 外用にのみ使用して下さい。
6. チューブの開け方  
キャップを逆向きにし、中にある突起部をチューブの口に深く差し込み、穴を開けて下さい。  
▶ オイラックスソフト
7. 容器の使い方
  - ・容器を逆さまに持って、スポンジ面を数回患部に押し付け、薬液をスポンジに充分浸透させて下さい。
  - ・薬液がスポンジに充分浸透していないと、スポンジが破れることがありますのでご注意下さい。
  - ・使用後はスポンジの乾燥を防ぐため、必ずキャップをしっかり閉めて下さい。
 ▶ マキロンかゆみどめ液P

### 【成分、分量に関連する注意】

1. 塗布後ほてり(熱感)を感じるがありますが、ごく短時間のうちに消失します。  
▶ オイラックスソフト
2. 本剤はアルコールを含んでいますので、しみる場合があります。  
▶ マキロンかゆみどめ液P

### 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 火気に近づけないで下さい。  
▶ マキロンかゆみどめ液P
5. 車の中など、高温になる場所に放置しないで下さい。容器が変形し、中栓部分の脱落や液もれがおこるおそれがあります。  
▶ マキロンかゆみどめ液P

### 【解 説】

4. 粘膜は感受性が強く、本剤を使用することにより刺激感が強くあらわれたり、症状が悪化するおそれがあります。
  5. 定められた投与経路、適用部位以外への使用は、思わぬ副作用や事故が発生するおそれがあります。
  6. チューブを失敗なく開けるための説明です。
  7. スポンジの破れを防ぎ、正しく使用するための説明です。
1. クロタミトンにより、一時的に感じる場合があります。
  2. アルコールにより、感じる場合があります。
1. 共通事項解説〔11〕参照
  2. 共通事項解説〔12〕参照
  3. 共通事項解説〔13〕参照
  4. 本剤にはアルコールが含まれているため、火気に近づけると引火するおそれがあります。
  5. 高温になる場所に放置すると、容器が変形したり、液もれがおこるおそれがあるので注意が必要です。

- オイラックスソフト
- マキロンかゆみどめ液P

### 【使用上の注意】

6. 本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。  
▶ マキロンかゆみどめ液P
7. 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

### 【解 説】

6. 本剤に有機溶剤(アルコール)が含まれているため、本剤が付着すると化学繊維、プラスチック類、塗装面等を変質、変色させる場合があります。
7. 共通事項解説〔17〕参照