

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	プレコール持続性せき止めカプセル
2	成分・分量	2カプセル中 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 60mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg、グアヤコールスルホン酸カリウム 135mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を1日2回、朝・夕に服用して下さい。 成人(15歳以上):1カプセル 15歳未満:服用しないで下さい。
4	効能・効果	せき、たん
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<p>1. 次の人は服用しないで下さい。 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人</p> <p>2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)</p> <p>3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。</p> <p>次に該当する人はお申し出下さい。 (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)授乳中の人 (4)高齢者 (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6)次の症状のある人 高熱、排尿困難 (7)次の診断を受けた人 心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害</p>
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用后、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。