



使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
第2類医薬品

△使用上の注意

【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起ります) 次の部位には使用しないで下さい。

(1)目や目の周囲、顔面、粘膜(例えは、口腔、鼻腔、脣等)、陰のう、外陰部等 (2)しつしん (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人 (2)乳幼児 (3)要などによりアリギー症状を起こしたことがある人 (4)患部が広範囲の人 (5)患部が化膿している人 (6)「しつしん」か「みずむし、いんきん」などといふかゆみ、かぶれ、かぶれ等の原因による場合がまれ)
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|------------------------------|
| 皮膚 | かぶれ、かゆみ、かぶれ、かぶれ等の原因による場合がまれ) |

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4. 使用後、症状ががえって悪化した場合(ただれたり、化膿したり、病巣が使用前より広がる等)は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

ピロエースWパウダースプレー
(**功能・効果**)みずむし、いんきんのむし、ぜにたむし
使用法1日2~3回、適量を患部に噴霧して下さい。
使用法に関連する注意(1)使用法を厳守して下さい。(2)患部やその周囲が汚れたまま使用しないで下さい。(3)目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて下さい。(5)外用にのみ使用して下さい。(6)使用前によく振ってから使用して下さい。(7)患部まで約10cmの距離で噴霧して下さい。(8)凍傷になる恐れがありますので、同じ箇所に連続して1秒以上噴霧しないで下さい。(9)内容物の残量が少なくなったときに、缶を横向きの状態で使用すると、出にくくなることがあります。

よく振ってから使用して下さい。

(成分・分量)70g中 ピロールニトロジン20mg(効価)、クロトリマゾール40mg、クロタミン500mg、I-メントール100mg、添加物:ソルビタンセスキオレイン酸エチル、トウモロコシデンプン、二酸化ケイ素、酸化チタン、ジソプロバソールアミン、エタノール、LPG (**成分・分量に関連する注意**) (1)本剤はアルコールを含んでいますのであります。(2)塗布後ほてり(熱感)を感じることがあります。短時間のうちに消失します。(3)保管及び取り扱い上の注意(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)火気につづけないで下さい。(4)本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装等を溶かしたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにして下さい。(5)缶底に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。(6)捨てるときには、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜いて下さい。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

製造販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

お問い合わせ先 お客様相談室
電話 03(5205)8331 受付時間 9:00~17:00
(土、日、祝日を除く)
http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/

火気と高温に注意
高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
(1)炎や火気の近くで使用しないこと。(2)火気を使用している室内で大量に使用しないこと。(3)高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーター等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。(4)火の中に入れないこと。(5)使い切って捨てること。
高圧ガス: LPG
火気厳禁 第一石油類 10mL ®登録商標
使用期限、製造番号は缶底記載

キャップ:PP G
外装フィルム:PP
金属:缶

987195567296

4