

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	サリドン A
2	成分・分量	1錠中 イソプロピルアンチピリン 150mg エテンザミド 250mg カフェイン水和物 50mg
3	用法・用量	次の量を、空腹時をさけて水またはお湯で服用してください [年齢:1回量:1日服用回数] 15歳以上:1錠:3回まで(服用間隔は4時間以上あけること) 8歳~15歳未満:1/2錠:3回まで(服用間隔は4時間以上あけること) 8歳未満:服用しないこと
4	効能・効果	頭痛・歯痛・月経痛(生理痛)・神経痛・関節痛・腰痛・肩こり痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・筋肉痛・打撲痛・骨折痛・捻挫痛・外傷痛の鎮痛, 悪寒・発熱時の解熱
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤または他の解熱鎮痛薬, かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は, 次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬, かぜ薬, 鎮静薬 3. 服用時は飲酒しないでください 4. 長期連用しないでください 次に該当する人はお申し出下さい (1)医師または歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦または妊娠していると思われる人 (3)水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっているまたはその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満) (4)高齢者 (5)本人または家族がアレルギー体質の人 (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (7)次の診断を受けた人:心臓病, 肝臓病, 腎臓病, 胃・十二指腸潰瘍
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。