

医薬品を正しく購入するための  
**説明文書**

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | 名称                                | サリドン Wi   |
| 2 | 成分・分量                             | 1錠中<br>イソプロピルアンチピリン(ピリン系)150mg、イブプロフェン 50mg、無水カフェイン 50mg<br>※添加物は外箱、添付文書を参照   |
| 3 | 用法・用量                             | 1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて水又はお湯で服用して下さい。<br>(服用間隔は6時間以上おいて下さい)<br>成人(15歳以上):1錠<br>15歳未満:服用しないで下さい。   |
| 4 | 効能・効果                             | 頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・<br>肩こり痛・打撲痛・ねんざ痛の鎮痛<br>悪寒・発熱時の解熱  |
| 5 | 保健衛生上の<br>危害を防止す<br>ために必要<br>な事項  | <ol style="list-style-type: none"> <li>次の人は服用しないで下さい。<br/>             (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人<br/>             (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人<br/>             (3)15歳未満の小児<br/>             (4)出産予定日12週以内の妊婦</li> <li>本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。<br/>             他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬</li> <li>服用前後は飲酒しないで下さい。</li> <li><u>長期連用しないで下さい。</u></li> </ol> <p>次に該当する人はお申し出下さい。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>医師又は歯科医師の治療を受けている人</li> <li>妊婦又は妊娠していると思われる人</li> <li>授乳中の人</li> <li>高齢者</li> <li>薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人</li> <li>次の診断を受けた人<br/>             心臓病、腎臓病、肝臓病、全身性エリテマトーデス、混合性結合組織病</li> <li>次の病気にかかったことのある人<br/>             胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病</li> </ol> |
| 6 | 薬剤師または<br>登録販売者が<br>必要と判断す<br>る事項 |   |

[注意事項]

- 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

2017.6 作成